

Mathematik 10b

Schuljahr 18/19

Organisation:

11.9.18

Heft/Ordner:

- * Übungsheft und Merkheft (oder Ordner)
- * kariert A4

Klassenarbeiten:

- * 4 KA
- * ca. 4 Kurztests (angesagt, als 1 KA)

Verhältnis:

- * 60% schriftlich
- * 40% mündlich

Kontakt:

- * schule@lehrer-kimmig.de
- * wiki.lehrer-kimmig.de
- * ab.lehrer-kimmig.de


GFS möglich

Material:

- * Buch im Unterricht dabei haben! (zu zweit)
- * Geodreieck (jeder)
- * Bleistift und einige Farben

Inhalte:

- I. Zuordnungen und Funktionen
- II. Differenzialrechnung
- III. Vektoren
- IV. Wahrscheinlichkeitsrechnung und Binomialverteilung
- V. Funktionsanalyse
- VI. Trigonometrie



I. Zuordnungen und Funktionen

I.1 Mengen

Eine Menge besteht aus mehreren Dingen, wie
z.B. Backzutaten, Menschen, Tieren, Einheiten, Zahlen, ...

Die einzelnen Dinge einer Menge heißen Elemente.

Beispiele: Schüler 10b = {Tobi, Claudio, Emil, Nils, ...}

Schulfächer = {Mathe, Deutsch, Physik, ...}

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

Bekannte Mengen aus der Mathematik:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \quad \text{natürliche Zahlen}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad \text{ganze Zahlen}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{7}{9}, 5, \dots\right\} \quad \text{rationale Zahlen (Brüche)}$$

$$\mathbb{R} = \{\pi, \sqrt{3}, 0.1, 5, -6, \dots\} \quad \text{reelle Zahlen ("alle" Zahlen)}$$

Aufgabe (mündlich):

Beschreibe mit Worten, welche Mengen gemeint sind:

$A = \{4, 8, 12, 16, \dots\}$ Vielfache von 4

$B = \{6, 12, 18, 24, \dots\}$ Vielfache von 6

$C = \{1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$ Brüche mit 1 im Zähler

$D = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ Alle Teiler von 12

$E = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$ Primzahlen


$F = \{1, 4, 9, 16, 25, \dots\}$ Quadratzahlen

$1^2 \quad 2^2 \quad 3^2 \quad 4^2 \quad 5^2$

I.2 Zuordnungen und Funktionen

Elementen einer sogenannten Definitionsmenge D_f werden bei einer Zuordnung Elemente einer sogenannten Wertemenge W zugeordnet

Beispiel:



Mathematisches Beispiel:

x	y
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16

Definitions-
menge

Werte-
menge

Eine Funktion ordnet jedem Element der Definitionsmenge maximal ein Element der Wertemenge zu.

Aufgabe (mündlich):


Ist diese Zuordnung eine Funktion?

x	y
1	-5
3	1
5	4
-2	6
3	2
-4	-3
0	7
6	0

nein!

Aufgabe (mündlich)

Stellt dieses Schaubild eine Funktion dar?



ja!

Aufgabe (mündlich):


Ist diese Zuordnung eine Funktion?

x	y
-6	9
0	6
7	0
3	4
2	3
4	5
1	3
3	4

ja!


Aufgabe (mündlich):

Stellt dieses Schaubild eine Funktion dar?



nein!

x	y
0	0
1	1
4	2
9	3
16	4
-4	—
-9	—



I.2.1 Darstellungsarten von Funktionen


Funktionsgleichung

$$y = x^2 + 1$$

einsetzen
und
ausrechnen





Wertetabelle

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5	2	1	2	5	10	17

Punkte
einzeichnenGraph im
Koordinatensystem

Aufgaben


1 Ist der Graph einer Funktion dargestellt? Begründen Sie Ihre Antwort.



2 Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \sqrt{x}$.

Ergänzen Sie im Heft die Wertetabelle und zeichnen Sie den Graphen von f .

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f(x)	0	0,5	0,71	1	1,41	1,73	2	2,23	2,44	2,64	2,82	3



I.3 Intervalle

Da Definitions- und Wertemenge oft in den reellen Zahlen liegen, benutzt man zu deren Beschreibung oft die Intervallschreibweise.

Beispiel: $f(x) = \sqrt{x}$

→ Definitionsmenge ohne negative Zahlen!

→ $\mathbb{D}: 0 \leq x < \infty$

→ $x \in [0, \infty)$

Beispiel 2: $\sqrt{\frac{1}{x}}$

→ $\mathbb{D}: 0 < x < \infty$

→ $x \in (0, \infty)$

Beispiele:

$$x \in [5, 7] \quad \text{meint:} \quad 5 \leq x \leq 7$$

$$x \in (3, 9] \quad \text{meint:} \quad 3 < x \leq 9$$

$$x \in [1, 6) \quad \text{meint:} \quad 1 \leq x < 6$$

$$x \in (-2, 5) \quad \text{meint:} \quad -2 < x < 5$$

I.4 Definitions- und Wertemenge von Funktionen

Merke: Definitionsmenge sind alle Zahlen, die man in die Funktion einsetzen darf (x-Werte)

Wertemenge sind alle möglichen Ergebnisse (y-Werte)

Beispiel: $f(x) = x^2 - 5$

$$D: x \in (-\infty, \infty)$$

$$W: y \in [-5, \infty)$$

Beispiel 2: $f(x) = -x^2 + 1$

$$D: x \in (-\infty, \infty) \text{ oder } x \in \mathbb{R}$$

$$W: y \in (-\infty, 1]$$

18.9.18

Aufgabe: Bestimme den Definitions- und Wertebereich von $f(x) = \frac{1}{x^2}$

D: alles außer 0 ,

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} , x \notin \{0\}$$

↑
Element
der Menge

↑
reelle
Zahlen

↑
außer

Null

$$W: (0, \infty)$$

S. 9, Nr. 10

● 10 ☒ Bestimmen Sie die Definitionsmenge und die Wertemenge der Funktion f.

a) $f(x) = x^2 + 1$

b) $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$

c) $f(x) = 1,5$

d) $f(x) = -0,5x + 1$

$$\mathcal{D} = (-\infty, \infty) \\ = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\mathcal{D} = (-\infty, \infty) \\ = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{D} = (-\infty, \infty) \\ = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{W} = [1, \infty)$$

$$\mathcal{W} = (1, \infty)$$

$$\mathcal{W} = \overline{[1,5, 1,5]} \\ = \{1,5\}$$

$$\mathcal{W} = (-\infty, \infty) \\ = \mathbb{R}$$

S. 8. Nr. 4 + 5

- 4 Welche Aussagen drücken denselben Sachverhalt für eine Funktion f aus?

$1 \notin W_f$

A

$1 \in D_f$

B

$1 \notin D_f$

D

$1 \in W_f$

C

F

Die Funktion f ist für $x = 1$ nicht definiert.

E

Der Graph von f enthält einen Punkt mit der x -Koordinate 1.

G

1 ist ein Funktionswert von f .

H

Auf dem Graphen von f liegt kein Punkt mit der y -Koordinate 1.

- 5 Statt „Der Funktionswert von f an der Stelle 2 ist 7.“ schreibt man kurz $f(2) = 7$. Drücken Sie entsprechend in mathematischer Kurzschrift aus.

a) Durch die Funktion f wird der Zahl $\sqrt{7}$ die Zahl 8 zugeordnet. $f(\sqrt{7}) = 8$

b) Die Funktion g nimmt an der Stelle 3,5 den Funktionswert -1 an. $g(3,5) = -1$


c) Die Funktionen f und g nehmen an der Stelle 5 denselben Funktionswert an. $f(5) = g(5)$

d) Wenn man in den Funktionsterm von h die Zahl 3 einsetzt, erhält man 19.

$$h(3) = 19$$

Graphen einfacher Funktionen

Ordne den Schaubildern die Funktionen zu und gib den Definitions- und Wertebereich an.



- | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| • x | • $0.5 \cdot x^2$ | • $-x^2 + 1$ | • $\frac{1}{x}$ | • $\sqrt{x}$ |
| • $0.5 \cdot x$ | • $2 \cdot x^2$ | • $3 \cdot (x-1)^2 - 2$ | • $\frac{1}{x^2}$ | • $\sqrt{\frac{1}{x}}$ |
| • $2 \cdot x$ | • $(x+2)^2$ | • x^3 | • $\frac{1}{x^3}$ | • $\sin(x)$ |
| • x^2 | • $x^2 + 2$ | • x^4 | • $\frac{1}{x^4}$ | • $\cos(x)$ |

I. 5 Funktionsklassen


Wir können Funktionen in verschiedene Gruppen einteilen:

1. lineare Funktionen:

Gerade im Schaubild

$$f(x) = x \quad / \quad f(x) = x + 2 \quad / \quad f(x) = 2x$$

→ kein Exponent bei x




2. Parabeln: (quadratische Funktionen)

Bogen im Schaubild

$$f(x) = x^2 \quad / \quad f(x) = x^2 + 1 \quad / \quad f(x) = 0,5 x^2$$

→ Als Exponent bei x immer 2




3. ganzrationale Funktionen

$$f(x) = x^3 \quad / \quad f(x) = x^4 \quad /$$

$$f(x) = 2 \cdot x^4 + 3 \cdot x^2$$

→ auch höhere Exponenten möglich




25.9.18

4. gebrochenrationale Funktionen

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad / \quad f(x) = \frac{1}{x^2}$$

→ x steht im Nenner



5. Wurzelfunktion

$$f(x) = \sqrt{x}$$



6. Trigonometrische Funktionen

$$f(x) = \sin(x) \quad / \quad f(x) = \cos(x) \quad /$$

$$f(x) = \tan(x)$$










→ periodische Funktionen, wiederholen sich

7. Exponentialfunktionen

$$f(x) = 2^x$$

→ x steht im Exponent






I.6 Verschieben und Strecken von Funktionen / Graphen

Wir können die sogenannte Normalparabel im Schaubild verschieben oder Strecken indem wir verschiedene Parameter verändern.


1. Verschiebung in y-Richtung



Die Normalparabel wird um einen Wert c nach oben verschoben, indem wir den Wert c zur Funktion dazu addieren.

$$f(x) = x^2 \longrightarrow f(x) = x^2 + 2$$

2. Verschiebung in x-Richtung



Eine Funktion kann nach rechts (oder links) verschoben werden, indem wir x durch $(x-b)$ ersetzen

$$f(x) = x^2 \longrightarrow f(x) = (x-b)^2$$


Achtung: Verschiebung nach rechts $\rightarrow$ Minus in Klammer
Verschiebung nach links $\rightarrow$ Plus in Klammer

Beispiel: Verschiebe $f(x) = x^2$ um 4 nach unten und 3 nach links

$$\rightarrow f(x) = (x+3)^2 - 4$$

nach links nach unten

3. Streckung



Eine Funktion wird um einen Faktor a gestreckt, indem wir diesen mit der Funktion multiplizieren.

$$f(x) = x^2 \longrightarrow f(x) = a \cdot x^2$$

Beispiel: $f(x) = x^2$ soll um den Faktor $\frac{1}{2}$ gestreckt, um 2 nach oben und um 1 nach rechts verschoben werden:

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot (x - 1)^2 + 2$$

Aufgabe: S. 11 A1

1 Wie erhält man aus dem Graphen von f mit $f(x) = x^2$ den Graphen von g ?

a) $g(x) = x^2 - 4$

b) $g(x) = \frac{1}{2}x^2$

c) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2$

d) $g(x) = (x - 3)^2$

e) $g(x) = x^2 + 1,5$

f) $g(x) = (x + 4)^2$

g) $g(x) = x^2 + 0,5$

h) $g(x) = 0,6x^2$

Mögliche GFS-Themen Mathe Klasse 10

Funktionsanalyse

- Polynomdivision
- Brennpunkt einer Parabel
- Trassierungen
- Parameterdarstellung von Kurven

Geometrie

- Kugelgeometrie
- Vektoren und Punkte im Raum

Wahrscheinlichkeitsrechnung

- Pascal'sches Dreieck
- Erwartungswert
- Bedingte Wahrscheinlichkeit
- Galtonbrett

Mögliche GFS-Themen in Physik Klasse 10

Mechanik

- Leichtathletik physikalisch betrachtet: Optimaler Absprung beim Weitsprung
- Kreisbewegungen in der Natur
- Geostationäre Satelliten
- Warum fällt ein Kreisel nicht um?

Atomphysik

- Marie Curie und ihre Forschungen
- Auswirkung von Strahlung auf den Körper


Energie

- Energieerhaltungssatz beim Treibhauseffekt

Ordne den Schaubildern die richtigen Gleichungen zu.

$y = (x+1)^2 - 3$	$y = (x+3)^2 + 2,5$	$y = (x-3)^2 + 2$
$y = -\frac{1}{3}(x-3)^2 + 2$	$y = -(x-3)^2 + 2$	$y = -2(x+2)^2 + 5$
$y = 0,5(x+2)^2 - 2$	$y = 0,5(x+2)^2 - 5$	$y = 0,5(x-2)^2 - 5$
$y = 2 \cdot (x+2)^2 - 5$	$y = -(x-2)^2 + 2$	$y = -2(x-2)^2 + 3$
$y = 0,5(x+2)^2 - 2$	$y = -\frac{1}{3}(x-3)^2 + 2$	$y = 0,5(x-2)^2 - 5$
$y = -(x-3)^2 + 2$	$y = 0,5(x+2)^2 - 5$	$y = -2(x-2)^2 + 3$
$y = -2(x+2)^2 + 5$	$y = (x+1)^2 - 3$	$y = -(x-2)^2 + 2$
$y = (x-3)^2 + 2$	$y = 2(x+2)^2 - 5$	$y = (x+3)^2 + 2,5$

Test: Wie Arbeitsblatt am 5.10.




S. 12 A4


28.8.18

4 Beschreiben Sie, wie man den Graphen der Funktion g aus dem Graphen der Funktion f mit


$f(x) = \frac{1}{x}$ (Fig. 1) erhält, und geben Sie einen Funktionsterm für g an.




$$y = \frac{1}{x} + 1$$



$$y = 0,5 \cdot \frac{1}{x}$$



$$y = \frac{1}{(x+1)}$$



$$y = -\frac{1}{x}$$

a) $f(x) = x^2$


b) $f(x) = x^2$

$g(x) = x^2 - 1,5$

$g(x) = x^2 + 1$

$h(x) = (x + 3)^2$

$h(x) = (x - 3)^2$



S. 12 A5

5 Skizzieren Sie die Graphen der Funktionen in ein gemeinsames Koordinatensystem.

a) $f(x) = \sqrt{x}$

$g(x) = \sqrt{x} + 1$

$h(x) = \sqrt{x-3}$


$i(x) = \sqrt{x+4}$


b) $f(x) = \sqrt{x}$

$g(x) = 1,5\sqrt{x}$

$h(x) = -1,5\sqrt{x}$


$i(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$





Verschobene Funktionen

Gib für jedes Schaubild die entsprechende Funktion an.



II. Differenzialrechnung

II.1 mittlere Änderungsrate

Bei einer Autofahrt von Stuttgart nach Hannover legt man folgende Strecken zurück:

Zeit in h	0	1	2	3	4	5
Strecke in km	0	130	185	320	470	510

- a) Wie groß ist die durchschnittliche Geschwindigkeit?
b) Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen Stunde 1 und 3?


$$a) \quad \frac{510 \text{ km}}{5 \text{ h}} = 102 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$b) \quad \frac{320 \text{ km} - 130 \text{ km}}{3 \text{ h} - 1 \text{ h}} = \frac{190 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 95 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Der sogenannte Differenzenquotient ist der Quotient aus folgenden beiden Differenzen:

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{bzw.} \quad \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$





Der Differenzenquotient entspricht der Steigung der Geraden durch die Punkte $P_1(x_1 | y_1)$ und $P_2(x_2 | y_2)$.

Die Gerade heißt Sekante

S. 37

- 1 ☒ Gegeben sind die Graphen der beiden Funktionen f und g.



Bestimmen Sie den Differenzenquotienten von f im angegebenen Intervall. Verfahren Sie danach ebenso mit g.

a) $I = [1; 3]$

b) $I = [-1; 2]$

c) $I = [0; 2]$

d) $I = [-1; 1]$

2 ☒ Berechnen Sie den Differenzenquotienten der Funktion f im Intervall I .

- S. 37
- | | | | |
|---|--|--|--|
| a) $f(x) = x^2$
$I = [0; 2]$ 2 | b) $f(x) = 3x^2$
$I = [-1; 3]$ 6 | c) $f(x) = 2x^3$
$I = [-1; 1]$ 2 | d) $f(x) = 3x^2 - 4$
$I = [1; 3]$ 12 |
| e) $f(x) = 2x^2 - 3$
$I = [2; 4]$ 12 | f) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3$
$I = [-2; 1]$ -0,5 | g) $f(x) = \sqrt{x}$
$I = [4; 9]$ 0,2 | h) $f(x) = \frac{1}{x}$
$I = [-1; -0,5]$ -2 |

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad x_1 &= -1 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= f(x_1) = -2 \\ y_2 &= f(x_2) = 2 \end{aligned}$$

$$x_2 - x_1 = 2$$

$$y_2 - y_1 = 4$$

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4}{2} = 2$$

S.39

8 Die Funktion h beschreibt die Höhe eines Ballons in Abhängigkeit von der Zeit t (t in Minuten nach dem Start, $h(t)$ in Meter). Der Ballon fährt 6 min nach dem Start in 170 m Höhe. Im Zeitintervall zwischen 6 min und 8 min steigt der Ballon mit der mittleren Geschwindigkeit $40 \frac{\text{m}}{\text{min}}$ senkrecht nach oben.

Ist die folgende Angabe richtig, falsch oder möglicherweise richtig?

a) $h(8) = 210$

b) $h(6) = 170$

c) $h(7) = 210$

d) $h(8) = 250$

e) $h(10) = 330$?

f) $h(7) = 180$



t	0						6	7	8	9	10
$h(t)$	0						170	210	250		

S. 39

10 Bestimmen Sie den Differenzenquotienten der Funktion f im Intervall I .

a) $f(x) = (x - 2)^2$, $I = [1; 6]$ 3

b) $f(x) = \frac{9}{x^2} - 3$, $I = [-3; -1]$ 4

c) $f(x) = \sqrt{x + 5} + x$, $I = [-4; -1]$ $\frac{4}{3}$

d) $f(x) = x^3 + x^2$, $I = [-2; 4]$ 14

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 4$$

$$y_1 = f(x_1) = (-2)^3 + (-2)^2 = -4$$


$$y_2 = f(x_2) = 4^3 + 4^2 = 80$$

$$x_2 - x_1 = 6$$

$$y_2 - y_1 = 84$$

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{84}{6} = 14$$

II.2 momentane Änderungsrate — Ableitung



Für einen fallenden Gegenstand
gilt $s(t) = 5 \cdot t^2$

Wie groß ist die durchschnittliche
Geschwindigkeit zwischen $t_1 = 1s$
und $t_2 = 2s$?

$$\frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{20 - 5}{2 - 1} = 15$$

Diese durchschnittliche Geschwindigkeit
liegt teilweise weit von der tatsächlichen
Geschwindigkeit entfernt.

Uns interessiert die tatsächliche Geschwindigkeit zum Zeitpunkt $t_1 = 1s$.

Dazu nähern wir t_2 schrittweise an t_1 an:

1. Schritt: $t_1 = 1s$ $s(t_1) = 5$ $\frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = 12,5$
 $t_2 = 1,5s$ $s(t_2) = 11,25$

2. Schritt: $t_1 = 1s$ $s(t_1) = 5$ $\frac{6,05 - 5}{1,1 - 1} = 10,5$
 $t_2 = 1,1s$ $s(t_2) = 6,05$

3. Schritt: $t_1 = 1s$ $s(t_1) = 5$ $\frac{5,1005 - 5}{1,01 - 1} = 10,05$
 $t_2 = 1,01s$ $s(t_2) = 5,1005$

4. Schritt: $t_1 = 1s$ $s(t_1) = 5$ $\frac{5,010005 - 5}{1,001 - 1} = 10,005$
 $t_2 = 1,001s$ $s(t_2) = 5,010005$

Fazit: Verkleinert man den Abstand zwischen t_1 und t_2 ,
so nähert sich der Wert (im Beispiel) immer weiter an
die 10 an. Man spricht vom sogenannten Grenzwert.

Wir versuchen, diesen Grenzwert mathematisch zu berechnen:

$$\begin{aligned}\frac{s(t_2) - s(1)}{t_2 - 1} &= \frac{5 \cdot t_2^2 - 5 \cdot 1^2}{t_2 - 1} = \frac{5(t_2^2 - 1^2)}{t_2 - 1} = \frac{5 \cdot (t_2 + 1) \cdot (t_2 - 1)}{(t_2 - 1)} \\ &= 5 \cdot (t_2 + 1)\end{aligned}$$

Hier in das umgeformte Ergebnis
dürfen wir für t_2 direkt den Wert
1 einsetzen: $5 \cdot (1+1) = \underline{\underline{10}}$

Distributivgesetz:

$$a \cdot b + a \cdot c = a(b+c)$$

1. Binomische Formel:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

2. Binomische Formel

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

3. Binomische Formel

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

18.10.18


Definition: Strebt der Grenzwert des Differenzenquotienten gegen einen festen Wert, so nennen wir diesen die Ableitung. Diese gibt die Steigung an,

Schreibweise: Man schreibt $f'(x)$


S.42

1 ☒ Entscheiden Sie, zu welchem der Graphen A bis D die Ableitungen gehören.


(1) $f'(1) = 2$




(2) $f'(1) = -2$



(3) $f'(1) = 0,5$



(4) $f'(1) = 0$



$f'(1) = 0$

$f'(1) = 0,5$

$f'(1) = 2$

$f'(1) = -2$


Themen KA: 6.11.

- Funktionsklassen zuordnen
- Verschieben und Strecken von Funktionen
- Differenzenquotient
- Ableitung

Übersicht zur 1. Klassenarbeit

1. Funktionsgleichungen bestimmen

Gib für jedes Schaubild die entsprechende Funktion an.



kein x^4 , kein $\frac{1}{x^3}$!

2. Differenzenquotient berechnen

Bestimme den Wert des Differenzenquotienten der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4$ im angegebenen Intervall.

$y_1 = 4, y_2 = -2$ $y_2 - y_1 = 2$

a) $I = [0; 2]$ $x_1 = 0, x_2 = 2$ $x_2 - x_1 = 2$

$x_1 = 0, x_2 = 2$ $x_2 - x_1 = 2$

b) $I = [-1; 1]$ $y_1 = -3,5, y_2 = -2$ $y_2 - y_1 = 0,5$

c) $I = [-1; 2]$ $y_1 = -3,5, y_2 = -2$ $y_2 - y_1 = 0,5$

$0,5$

d) $I = [-2; 1]$ $y_1 = -3,5, y_2 = -2$ $y_2 - y_1 = 0,5$

$-0,5$

3. Differenzenquotient berechnen

Bestimme mithilfe der Wertetabelle den Differenzenquotienten im angegebenen Intervall.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	-82,5	-44	-19,5	-6	-0,5	0	-1,5	-2	1,5	12	32,5	66

a) $I = [0; 4]$

b) $I = [-3; 3]$

c) $I = [-5; 6]$

$y_1 = 0, y_2 = 12$

$x_1 = 0, x_2 = 4$

$DQ = 3$

$y_1 = -19,5, y_2 = 1,5$

$x_1 = -3, x_2 = 3$

$DQ = 3,5$




$y_1 = -82,5, y_2 = 66$

$x_1 = -5, x_2 = 6$

$DQ = 13,5$

4. Differenzenquotient bestimmen


Bestimme mithilfe der Graphen den Differenzenquotienten im angegebenen Intervall.



- a) $I = [0; 2]$ $DQ = 1$ b) $I = [-1; 1]$ $DQ = -0,5$ c) $I = [-1; 2]$ $DQ = -\frac{3,5}{3}$

5. Wahr oder falsch




Das Schaubild zeigt den Graphen einer Funktion f . Bestimme, ob die Aussagen zum Differenzenquotienten von f wahr oder falsch sind:



- a) Im Intervall $[0; 2]$ ist der Differenzenquotient 1. ✓ c) Im Intervall $[1; 3]$ ist der Differenzenquotient 0. ✓
 b) Im Intervall $[0; 3]$ ist der Differenzenquotient 1,5. f d) Im Intervall $[0; 4]$ ist der Differenzenquotient positiv. f
 e) Im Intervall $[-1; 1]$ ist der Differenzenquotient kleiner als im Intervall $[0; 2]$ f

6. Ableitung

Bestimme die Ableitung an der angegebenen Stelle x



- a) $x = 2$ b) $x = 0$ c) $x = 1$

Wir wollen nun die Ableitung an der

Stelle $t_1 = 2$ berechnen:

$$s(t) = 5 \cdot t^2$$

$$\frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{s(t_2) - s(2)}{t_2 - 2}$$

=

8.11.18

○ 4 Es ist $f(x) = x^2$. Bestimmen Sie rechnerisch die Ableitung von f an der Stelle

a) 3,

b) 4,

c) 5,

d) -1.

$$f'(3) = 6$$

$$f'(4) = 8$$

$$f'(5) = 10$$

$$f'(-1) = -2$$

$$f(x) = x^2$$

$$a) \quad \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{t_2^2 - 3^2}{(t_2 - 3)}$$

$$= \frac{(t_2 + 3) \cdot \cancel{(t_2 - 3)}}{\cancel{(t_2 - 3)}} = t_2 + 3$$

$$\Rightarrow f'(3) = 6$$

$$f(x) = x^2$$

$$f(3) = 3^2$$

$$f(17) = 17^2$$

$$f(t_2) = t_2^2$$

$$g(x) = x^3 - 5 \cdot x^2$$

$$g(3) = (3)^3 - 5 \cdot (3)^2$$

$$g(a) = (a)^3 - 5 \cdot (a)^2$$

$$g(a-5) = (a-5)^3 - 5 \cdot (a-5)^2$$

$$g(-7) = (-7)^3 - 5 \cdot (-7)^2$$

$$f(x) = 5 \cdot x^2$$

$$f'(1) = 10$$

$$f'(7) = 70$$

$$f(x) = x^2$$

$$f'(1) = 2$$

$$f'(7) = 14$$

$$f(x) = 9 \cdot x^2$$

$$f'(2) = 36$$

S. 43

$$f(x) = 3 \cdot x^2$$

$$f'(2) = 12$$

13.11.18

- 9 a) Es ist $f(x) = 3x^2 - 2$. Bestimmen Sie rechnerisch $f'(2)$.
 b) Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 5x^2 + 4$. Ermitteln Sie $f'(1)$.

$$f'(2) = \frac{f(t_2) - f(2)}{t_2 - 2}$$

$$f(t_2) = 3 \cdot t_2^2 - 2$$

$$f(2) = 3 \cdot 2^2 - 2$$

$$= \frac{(3 \cdot t_2^2 - 2) - (3 \cdot 2^2 - 2)}{t_2 - 2}$$

$$= \frac{+3 \cdot t_2^2 - 3 \cdot 2^2}{t_2 - 2}$$

$$= \frac{3 \cdot (t_2^2 - 2^2)}{t_2 - 2}$$

$$= \frac{3 \cdot (t_2 - 2) \cdot (t_2 + 2)}{t_2 - 2}$$

$$= 3 \cdot (t_2 + 2)$$

$$f'(2) = 3 \cdot (2 + 2) = 12$$

- 9 a) Es ist $f(x) = 3x^2 - 2$. Bestimmen Sie rechnerisch $f'(2)$.
b) Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 5x^2 + 4$. Ermitteln Sie $f'(1)$.
c) $f(x) = 4x$, bestimme $f'(3)$

$$\begin{aligned} \text{b) } f'(1) &= \frac{f(t_2) - f(1)}{t_2 - 1} & f(t_2) &= 5 \cdot t_2^2 + 4 \\ & & f(1) &= 5 \cdot 1^2 + 4 \\ &= \frac{5t_2^2 + 4 - (5 \cdot 1^2 + 4)}{t_2 - 1} &= \frac{5t_2^2 + \cancel{4} - 5 \cdot 1^2 - \cancel{4}}{t_2 - 1} \\ &= \frac{5 \cdot (t_2^2 - 1^2)}{t_2 - 1} &= \frac{5(\cancel{t_2 - 1})(t_2 + 1)}{\cancel{t_2 - 1}} = 5(t_2 + 1) \end{aligned}$$

$$f'(1) = 5(1 + 1) = 10$$

- 9 a) Es ist $f(x) = 3x^2 - 2$. Bestimmen Sie rechnerisch $f'(2)$.
b) Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 5x^2 + 4$. Ermitteln Sie $f'(1)$.
c) $f(x) = 4x$, bestimme $f'(3)$

$$c) f'(3) = \frac{f(t_2) - f(3)}{t_2 - 3}$$

$$f(t_2) = 4 \cdot t_2$$

$$f(3) = 4 \cdot 3$$

$$= \frac{4 \cdot t_2 - 4 \cdot 3}{t_2 - 3} = \frac{4 \cdot (\cancel{t_2} - \cancel{3})}{\cancel{t_2} - \cancel{3}} = 4$$

$$f'(3) = 4$$

II. 3 Ableitungsregeln

Wir haben folgende Regeln herausgefunden:

1. Bei einer quadratischen Funktion $f(x) = x^2$ ist die Ableitung an einer Stelle t

$$f'(t) = 2 \cdot t$$

2. Mit einem konstanten Vorfaktor $f(x) = a \cdot x^2$ gilt

$$f'(t) = 2 \cdot a \cdot t$$

3. Bei einer linearen Funktion $f(x) = a \cdot x$ gilt

$$f'(t) = a$$

4. Wird eine Funktion nach oben/unten verschoben, so ändert sich die Ableitung nicht, d.h. von den Funktionen $f(x) = 5x^2$ und $g(x) = 5x^2 - 9$ ist die Ableitung identisch.

Beispiele: $f(x) = 3 \cdot x^2 + 4$

$$f(x) = -7 \cdot x^2 - 3$$

$$f(x) = -5x + 2$$

$$f(x) = 2 \cdot x^2 - 3x$$

$$f(x) = 2 \cdot x^2$$

$$f(x) = -3x$$

$$f'(2) = 12$$

$$f'(1) = -14$$

$$f'(17) = -5$$

$$f'(1) = 4 - 3 = 1$$

$$f'(1) = 4$$

$$f'(1) = -3$$

15.11.18

5. Haben wir eine Funktion, die aus einer Summe oder Differenz besteht, so bilden wir die Ableitung von den einzelnen Summanden, z.B.

$$f(x) = 3x^2 + 5x,$$

$$f'(2) = 3 \cdot 2 \cdot 2 + 5 = 17$$

6. Bei einer Funktion mit einer höheren Potenz/Exponent $f(x) = x^n$ gilt für die Ableitung an der Stelle t :

$$f'(t) = n \cdot t^{n-1}$$

$$\text{Beispiel: } f(x) = x^3 \quad f'(5) = 3 \cdot 5^2 = 75$$

Beispiele:

$$f(x) = x^2 \rightarrow f'(t) = 2 \cdot t^1$$

$$f(x) = x^1 \rightarrow f'(t) = 1 \cdot \underbrace{t^0}_1$$

$$f(x) = 3 \cdot x^7 \rightarrow f'(t) = 7 \cdot 3 \cdot t^6$$

$$f(x) = 4x^2 - 3x^1 \rightarrow f'(t) = 2 \cdot 4t - 3 \cancel{t^0}$$

$$f(x) = 2 \cdot x^{-3} \rightarrow f'(t) = -3 \cdot 2 \cdot t^{-4}$$

$$f(x) = \frac{5}{x^2} = 5 \cdot x^{-2} \rightarrow f'(t) = -2 \cdot 5 \cdot t^{-3}$$


$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow f'(t) = \frac{1}{2} \cdot t^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{t}}$$

1. Klassenarbeit, 6.11.2018

Name: _____ Punkte: _____/26P Note: _____ mündlich: _____

1. Funktionsgleichungen bestimmen (8P)

Gib für jedes Schaubild die entsprechende Funktion an.



2. Differenzenquotient berechnen (4P)

Bestimme den Wert des Differenzenquotienten der Funktion $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$ im angegebenen Intervall.

$$2 \cdot (-1)^3 - (-1)^2 + 1$$

a) $I = [0; 2]$

b) $I = [-1; 1]$

c) $I = [-1; 2]$

d) $I = [-2; 1]$

3. Differenzenquotient berechnen (3P)

Bestimme mithilfe der Wertetabelle den Differenzenquotienten im angegebenen Intervall.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	73	56	21	13	1	-4	-6	2	9	-3	-8	-15


a) $I = [0; 4]$

b) $I = [-3; 3]$


c) $I = [-5; 6]$

4. Differenzenquotient bestimmen (3P)


Bestimme mithilfe der Graphen den Differenzenquotienten im angegebenen Intervall.



a) $I = [-1; 2]$




b) $I = [-2; 0]$



c) $I = [0; 3]$

5. Wahr oder falsch (5P)

Das Schaubild zeigt den Graphen einer Funktion f . Bestimme, ob die Aussagen zum Differenzenquotienten (DQ) von f wahr oder falsch sind:



a) Im Intervall $[2; 3]$ ist der DQ 1.

c) Im Intervall $[0; 4]$ ist der DQ 0.

b) Im Intervall $[0; 3]$ ist der DQ -1,5.

d) Im Intervall $[1; 3]$ ist der DQ negativ.


e) Im Intervall $[-0.5; 3]$ ist der DQ kleiner als im Intervall $[0; 2]$

-0,71


-1

6. Ableitung (3P)


Bestimme die (ungefähre) Ableitung an der angegebenen Stelle x



a) $x = -1$



b) $x = 2$



c) $x = 0$

1 ☒ Bestimmen Sie $f'(x)$ für f mit

- a) $f(x) = x^4$, $f'(x) = 4 \cdot x^3$ b) $f(x) = x^7$, $f'(x) = 7x^6$ c) $f(x) = x^6$, $f'(x) = 6x^5$ d) $f(x) = x^9$, $f'(x) = 9x^8$
 e) $f(x) = x^8$, $f'(x) = 8x^7$ f) $f(x) = x^{10}$, $f'(x) = 10x^9$ g) $f(x) = x^{11}$, $f'(x) = 11x^{10}$ h) $f(x) = x^{101}$, $f'(x) = 101x^{100}$

2 ☒ Wie groß ist die Steigung des Graphen von f im gegebenen Punkt A?

- a) $f(x) = x^2$, A(3|9) $f'(x) = 2x$, $f'(3) = 6$ b) $f(x) = x^3$, A(2|8) $f'(x) = 3x^2$, $f'(2) = 12$ c) $f(x) = x^9$, A(1|1) $f'(x) = 9x^8$, $f'(1) = 9$ d) $f(x) = x^{20}$, A(-1|1) $f'(x) = 20x^{19}$, $f'(-1) = -20$

3 ☒ Es ist $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$. Schreiben Sie den Funktionsterm entsprechend um und leiten Sie ab.

- a) $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$ b) $f(x) = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$ c) $f(x) = \frac{1}{x^4}$ d) $f(x) = \frac{1}{x^{30}}$

$$f'(x) = -1 \cdot x^{-2} \quad f'(x) = -3 \cdot x^{-4} \quad f'(x) = -4 \cdot x^{-5} \quad f'(x) = -30 \cdot x^{-31}$$

 1 Bestimmen Sie die Ableitung f' .

$f(x)$	x^3	x^5	x^{12}	x^{15}	x^{20}
$f'(x)$	$3 \cdot x^2$	$5 \cdot x^4$	$12x^{11}$	$15x^{14}$	$20x^{19}$
$f(x)$	x^{-3}	x^{-5}	x^{-12}	x^{-15}	x^{-20}
$f'(x)$	$-3x^{-4}$	$-5x^{-6}$	$-12x^{-13}$	$-15x^{-16}$	$-20x^{-21}$

$f(x)$	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\frac{1}{x^6} = x^{-6}$	$\frac{1}{x^8} = x^{-8}$
$f'(x)$	$-x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$	$-6x^{-7} = -6 \cdot \frac{1}{x^7}$	$-8x^{-9} = -8 \cdot \frac{1}{x^9}$

 **2** Geben Sie in der Tabelle an, ob richtig (r) oder falsch (f) abgeleitet wurde. Korrigieren Sie die Fehler gegebenenfalls in der letzten Spalte.

f(x)	f'(x)	r/f	Korrektur
x^8	$8x^7$	✓	
x^{16}	$16x^{15}$	f	$16x^{15}$
x^{-4}	$-4x^{-5}$	f	$-4x^{-5}$
x^1 $f'(x)=1$	1	✓	
$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2}\sqrt{x}$	f	$\frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$

3 Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^4$. Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion $f'(x) =$ _____.

a) Berechnen Sie die Steigung des Graphen von f im Punkt $A(2|16)$.

[illegible]

b) Berechnen Sie die Stelle, an der die Ableitung der Funktion f den Wert -4 annimmt.

[illegible]

c) Bestimmen Sie den Punkt des Graphen von f , in dem die Tangente an den Graphen parallel zur Geraden mit der Gleichung $y = 8x$ verläuft. [T1]



4 Leiten Sie ab.

a) $f(a) = a^3$; $f'(a) =$ _____ b) $g(b) = b^{10}$; $g'(b) =$ _____ c) $h(c) = c$; $h'(c) =$ _____

d) $k(r) = r^{-1}$; $k'(r) =$ _____ e) $l(s) = \frac{1}{s^7}$; $l'(s) =$ _____ f) $m(t) = \sqrt{t}$; $m'(t) =$ _____

g) $f(x) = x^n$; $f'(x) =$ h) $f(x) = x^{b-1}$; $f'(x) =$ i) $f(x) = x^{2-2k}$; $f'(x) =$

5 Gegeben sind die beiden Funktionen f mit $f(x) = x^3$ und g mit $g(x) = x^4$. Bestimmen Sie alle Stellen, an denen der Graph von f dieselbe Steigung hat wie der Graph von g . Geben Sie auch die zugehörigen Punkte auf den Graphen von f und g an sowie die Steigung der Tangenten in diesen Punkten.

$f'(x) =$ und $g'(x) =$ Gleichsetzen der Ableitungen und Auflösen nach x:



An den Stellen $x_1 =$ _____ und $x_2 =$ _____ haben die Graphen von f und g dieselbe Steigung. Für $x_1 =$ _____ :

Im Punkt _____ sind die Tangenten an die Graphen von f und g parallel mit der Steigung _____.

Für $x_2 =$: In den Punkten und sind die Tangenten parallel mit der Steigung

[T1] Die Gerade $y = 8x$ hat in jedem Punkt die Steigung 8.

$$f(x) = x^0$$

$$f'(x) = 0 \cdot x^{-1} = 0$$

1 Leiten Sie die Funktion f zweimal ab.

a) $f(x) = 4x^2$

$f'(x) = 4 \cdot 2 \cdot x = 8x$

$f''(x) = 8 \cdot 1 \cdot x^0 = 8$

b) $f(x) = 2x^{-2}$

$f'(x) = -4 \cdot x^{-3}$

$f''(x) = 12 \cdot x^{-4}$

c) $f(x) = 2x^6 + x^3$

$f'(x) = 12 \cdot x^5 + 3 \cdot x^2$

$f''(x) = 60 \cdot x^4 + 6 \cdot x^1$

d) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^{-4}$

$f'(x) = x^3 + 4 \cdot x^{-5}$

$f''(x) = 3 \cdot x^2 - 20 \cdot x^{-6}$

e) $f(x) = 0,5x^5 - 2x^3$

$f'(x) = 2,5 \cdot x^4 - 6 \cdot x^2$

$f''(x) = 10 \cdot x^3 - 12 \cdot x^1$

f) $f(x) = \frac{4}{x^4} + \frac{1}{x^2}$

$f'(x) = -16 \cdot x^{-5} - 2 \cdot x^{-3}$

$f''(x) = 80 \cdot x^{-6} + 6 \cdot x^{-4}$

2 Kim hat Ableitungen gebildet. Kontrollieren Sie die Ableitungen (r für richtig und f für falsch) und verbessern Sie gegebenenfalls. Beschreiben Sie auch, worin der Fehler besteht.

	Funktion f	Ableitung	Kontrolle und Verbesserung	Fehlerbeschreibung
a)	$f(x) = x^3 + 3x$	$f'(x) = 3x^2 + 3$	f $f'(x) = 3x^2$	2. Summand wurde nicht abgeleitet.
b)	$f(x) = x \cdot (1 - 3x)$	$f'(x) = -3$	f $f'(x) = 1 - 6x$	
c)	$f(x) = x^2 + x$	$f'(x) = 2x + 1$	r	
d)	$f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 4x$	$f'(x) = \frac{1}{3}x - 4$	f $f'(x) = \frac{4}{3}x - 4$	
e)	$f(t) = tx^2$	$f'(t) = 2tx$	r	

3 Wandeln Sie den Funktionsterm von f um. Geben Sie dann den Grad von f und den Grad der Ableitungsfunktion f' an. Bestimmen Sie f'(x).

a) $f(x) = x^2 \cdot (x - 2)$

=
=

Grad von f: ____; Grad von f': ____

$f'(x) =$ _____

b) $f(x) = (x + 2)^2 \cdot 5$

=
=

Grad von f: ____; Grad von f': ____

$f'(x) =$ _____

c) $f(x) = 4 \cdot (x^4 + 3) \cdot x^2$

=
=

Grad von f: ____; Grad von f': ____

$f'(x) =$ _____

4 Die Tangente an die Parabel der Funktion f mit $f(x) = 1,5x^2$ im Punkt P soll die Steigung m haben. Bestimmen Sie den Punkt $P(x_0 | f(x_0))$.

a) $m = 6$


$f'(x) =$ _____, also muss die

Gleichung _____ = 6 gelten.


Damit erhält man $x_0 =$ _____

und $P(\text{____} | \text{____})$.

b) $m = 1,5$



c) $m = -2$



5 Verbinden Sie zusammengehörende Karten.

$f(x) = x^2 + tx$

$f(x) = tx^2 + tx$

$f(x) = x^2 - t^2x$

$f(t) = tx^2 + tx$

$f(t) = x^2 - t^2x$

$f(t) = tx^2 - t^2x$

$f(t) = -2tx$

$f(t) = x^2 - 2tx$

$f(t) = x^2 + x$

$f(x) = 2x + t$

$f(x) = 2x - t^2$

$f(x) = 2tx + t$

$$f(x) = 30 \cdot a \cdot x^5$$

$$f'(x) = 30 \cdot a \cdot 5 \cdot x^4$$

$$f''(x) = 30 \cdot a \cdot 5 \cdot 4 \cdot x^3$$

$$f(x) = 5 \cdot \frac{1}{x^2} = 5 \cdot x^{-2}$$

$$f'(x) = 5 \cdot (-2) \cdot x^{-3}$$

$$f''(x) = 5 \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot x^{-4}$$

ca. 24 Punkte für 1

Kurztest: Ableitungen - A

Name: _____ Punkte: _____/28P Note: _____

1. Bestimme die Ableitungen $f'(x)$ und $f''(x)$

Hinweis: a steht für eine beliebige Zahl!

a) $f(x) = 3x^4$ $f'(x) = 4 \cdot 3 \cdot x^3 = 12x^3$

$f''(x) = 36x^2$

b) $f(x) = 2x^2 - 5x^3$ $f'(x) = 2 \cdot 2 \cdot x - 5 \cdot 3 \cdot x^2 = 4x - 15x^2$

$f''(x) = 4x^0 - 15 \cdot 2 \cdot x^1 = 4 - 30x$

c) $f(x) = 2x^5 - 3 \cdot a \cdot x^3$ $f'(x) = 5 \cdot 2 \cdot x^4 - 3 \cdot a \cdot 3 \cdot x^2 = 10x^4 - 9a \cdot x^2$

$f''(x) = 10 \cdot 4 \cdot x^3 - 9 \cdot a \cdot 2 \cdot x^1 = 40x^3 - 18ax$

d) $f(x) = \sqrt{x}$ $f'(x) = \frac{1}{2} x^{-1/2}$

$f(x) = x^{1/2}$

$f''(x) = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot x^{-3/2} = -\frac{1}{4} \cdot x^{-3/2}$

e) $f(x) = \frac{1}{x^2} = 1 \cdot x^{-2}$ $f'(x) = 1 \cdot (-2) \cdot x^{-3} = -2 \cdot x^{-3}$

$f''(x) = (-2) \cdot (-3) \cdot x^{-4} = 6x^{-4}$

f) $f(x) = 9x^4 - 4x^2 - 8$ $f'(x) = 9 \cdot 4 \cdot x^3 - 4 \cdot 2 \cdot x^1 = 36x^3 - 8x$

$f''(x) = 36 \cdot 3 \cdot x^2 - 8 \cdot 1 \cdot x^0 = 108x^2 - 8$

g) $f(x) = 5\sqrt{x} = 5 \cdot x^{1/2}$ $f'(x) = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2} = 2,5 \cdot x^{-1/2}$

$f''(x) = 2,5 \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot x^{-1,5} = -1,25x^{-1,5}$

h) $f(x) = \frac{3}{x^5} = 3 \cdot x^{-5}$ $f'(x) = 3 \cdot (-5) \cdot x^{-6} = -15 x^{-6}$

$f''(x) = (-15) \cdot (-6) \cdot x^{-7} = 90 x^{-7}$

i) $f(x) = x^2 \cdot (x + 2)$
 $= x^3 + 2x^2$ $f'(x) = 3x^2 + 4x$

$f''(x) = 6x + 4$

j) $f(x) = \frac{3}{4} \cdot x^{-4} + \frac{1}{2} \cdot \cancel{\frac{1}{2}} x^{-2}$ $f'(x) = \frac{3}{4} \cdot (-4) \cdot x^{-5} + \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot x^{-3} = -3x^{-5} - x^{-3}$

$f''(x) = (-3) \cdot (-5) \cdot x^{-6} - (-3) x^{-4} = 15x^{-6} + 3x^{-4}$

k) $f(x) = \frac{2}{3} \cdot x^6 - 2\sqrt{x} + 4$ $f'(x) = \frac{2}{3} \cdot 6 x^5 - 2 \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} = 4x^5 - x^{-1/2}$

$\frac{2}{3} \cdot x^6 - 2 \cdot x^{1/2} + 4$ $f''(x) = 20x^4 + 0,5 x^{-1,5}$

l) $f(x) = 6 \cdot a \cdot x^2 + a$ $f'(x) = 6 \cdot a \cdot 2 \cdot x^1 = 12 \cdot a \cdot x$

$f''(x) = 12a$

m) $f(x) = \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x^{-4}}$ $f'(x) = -8x^{-3} + 12x^3$

$= 4x^{-2} + 3x^4$ $f''(x) = 24x^{-4} + 36x^2$

n) $f(x) = \sqrt{x^3} = x^{3/2}$ $f'(x) = \frac{3}{2} \cdot x^{1/2}$

$f''(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2} = \frac{3}{4} x^{-1/2}$

II.4 Tangente

Eine Tangente an einer Funktion

- berührt diese an einem Punkt P
- ist eine lineare Funktion mit der Gleichung

$$y = m \cdot x + c$$

Steigung

Verschiebung
nach oben/unten

- hat als Steigung die selbe wie die Funktion
an Punkt P $\rightarrow$ Ableitung

Beispiel: $f(x) = x^2$, wir suchen die Tangente am Punkt $P(2|4)$

$$y = m \cdot x + c$$

Schritt 1: wir berechnen die Steigung m :

$$f'(x) = 2x$$

→ x -wert einsetzen

$$f'(2) = 2 \cdot 2 = 4 = m$$

$$y = 4 \cdot x + c$$

Schritt 2: Um den y -Achsenabschnitt c auszurechnen, setzen wir den Punkt P in die Tangentengleichung ein:

$$y = 4 \cdot x + c$$

$$4 = 4 \cdot 2 + c \quad | -8$$

$$-4 = c$$

Ergebnis: Die Tangente hat die Gleichung $y = 4x - 4$

S. 59

- 3 Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $B(b|f(b))$.
- a) $f(x) = x^2$, $b = 2$ $B(2|4)$ b) $f(x) = 2x^2 - 3x$, $b = 1$ $B(1|-1)$ c) $f(x) = \frac{8}{3}x^3$, $b = \frac{2}{3}$
 d) $f(x) = x^3 - 2x^2$, $b = 2$ e) $f(x) = 3x^4 + 4x$, $b = -1$ f) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $b = -2$

b) $f'(x) = 4x - 3$

$f'(1) = 4 - 3 = 1 = m$

$y = 1 \cdot x + c$

$-1 = 1 + c \quad | -1$

$-2 = c$

$\Rightarrow y = 1 \cdot x - 2$

c) $y = 2x - \frac{2}{3}$

d) $y = 4x - 8$

e) $y = -8x - 9$

f) $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$

Lösungswort: FERMAT

Lösungen zu Aufgabe 3:

$y = x - 2$ E
 $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$ T
 $y = -8x - 9$ A
 $y = 4x - 4$ F
 $y = 2x - \frac{2}{3}$ R
 $y = 4x - 8$ M

$$c) \quad f(x) = \frac{8}{3} x^3$$

$$b = \frac{1}{2}$$

$$Z\left(\frac{1}{2} \mid \frac{1}{3}\right)$$

$$f'(x) = 3 \cdot \frac{8}{3} \cdot x^2 = 8x^2$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2 = m$$

$$y = 2 \cdot x + c$$

$$\frac{1}{3} = \underbrace{2 \cdot \frac{1}{2}} + c$$

$$\frac{1}{3} = 1 + c \quad | -1$$

$$-\frac{2}{3} = c$$

$$y = 2 \cdot x - \frac{2}{3}$$

1 Der Graph der Funktion f hat im Punkt P die Tangente t . Markieren Sie zusammengehörende Karten.

$f'(0) = 2$ $x=0$	$f'(1) = -1$ $x=1$	$P(0 2)$	$f'(0) = 0$ $x=0$	$f'(1) = 1$ $x=1$
$P(1 0,5)$	$t(x) = -x + 0,5$ $m = -1$	$t(x) = x - 0,5$ $m = 1$	$t(x) = 2$ $m = 0$	$t(x) = 2x$ $m = 2$
			$P(0 0)$	$P(1 -0,5)$

2 Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(b|f(b))$.

a) $f(x) = 2x^2 - 3x$, $b = 2$

Ansatz für die Tangentengleichung: $y = m \cdot x + c$.

Ableiten der Funktion f ergibt $f'(x) = 4x - 3$.

Für die Steigung der Tangente gilt: $m = f'(2) = 5$.

Den y-Achsenabschnitt der Tangente erhält man

durch Einsetzen der Koordinaten von $P(2|2)$:

$$\begin{aligned} y &= 5 \cdot x + c \\ 2 &= 5 \cdot 2 + c \quad | -10 \\ -8 &= c \end{aligned}$$

Die Tangente hat die Gleichung $y = 5x - 8$.

b) $f(x) = 0,5 \cdot x^3 - 1$, $b = 1$

$$f'(x) = 0,5 \cdot 3 \cdot x^2$$

$$f'(1) = 1,5 \text{ (m)}$$

$$\begin{aligned} y &= 1,5 \cdot x + c \\ 2 &= 1,5 \cdot 1 + c \\ -0,5 &= 1,5 \cdot 1 + c \quad | -1,5 \\ -2 &= c \end{aligned}$$

$$y = 1,5 \cdot x - 2$$

Die Tangente hat die Gleichung $y = 1,5x - 2$.

In welchem Punkt schneidet die **Tangente** an den Graphen der Funktion f im Punkt B die x-Achse?

a) $f(x) = 0,5x^2$, B(2|f(2))

b) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2$, B(-1|f(-1)) c) $f(x) = \frac{3}{x}$, B(-1|f(-1))

a) $f'(x) = x$

$y = f(2) = 0,5 \cdot 2^2 = 2$ B(2|2)

(y-Wert bekommt man raus, indem man den x-Wert in die ursprüngliche Funktion einsetzt)

$m = f'(2) = 2$

(Steigung bekommt man, wenn man den x-Wert in die Ableitung einsetzt)

Tangente:

$y = m \cdot x + c$

wir setzen alles ein:

$2 = 2 \cdot 2 + c \quad | -4$

$-2 = c$

Ergebnis Tangente:

$y = 2 \cdot x - 2$

Schnittpunkt mit x-Achse ($y=0$)

$0 = 2 \cdot x - 2 \quad | +2x$

löse nach x auf:

$-2x = -2 \quad | :(-2)$

$x = 1$

Schnittpunkt: S(1|0)

In welchem Punkt schneidet die Tangente an den Graphen der Funktion f im Punkt B die x-Achse?

a) $f(x) = 0,5x^2$, $B(2|f(2))$

b) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2$, $B(-1|f(-1))$

c) $f(x) = \frac{3}{x}$, $B(-1|f(-1))$

$$f(x) = 3 \cdot x^{-1}$$

b) $y = f(-1) = \frac{5}{3} = 1,67$

$$f'(x) = x^2 + 4x$$

$$m = f'(-1) = -3$$

Tangente: $y = m \cdot x + c$

$$\frac{5}{3} = (-3) \cdot (-1) + c \quad | -3$$

$$-\frac{4}{3} = c$$

Tangente: $y = -3x - \frac{4}{3}$

Schnittpunkt $0 = -3x - \frac{4}{3} \quad | + \frac{4}{3}$

$$| : (-3)$$

$$S(-0,44|0) \quad -\frac{4}{3} = x = -0,44$$

c) $y = f(-1) = -3$

$$f'(x) = -3 \cdot x^{-2}$$

$$m = f'(-1) = -3$$

Tangente: $y = m \cdot x + c$

$$-3 = (-3) \cdot (-1) + c \quad | -3$$

$$-6 = c$$

Tangente: $y = -3x - 6$

Schnittpunkt: $0 = -3x - 6 \quad | + 6$
 $6 = -3x \quad | : (-3)$

$$S(-2|0) \quad -2 = x$$

3 Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente t an den Graphen der Funktion f im Punkt P.

a) $f(x) = x^2 + x$; $P(1|f(1))$; $f'(x) = 2 \cdot x + 1$

t: $y = m \cdot x + c$ mit $m = f'(1) = 3$

Einsetzen der Koordinaten von $P(1|2)$:

$$\begin{aligned} 4 &= m \cdot x + c \\ 2 &= 3 \cdot 1 + c \quad | -3 \\ -1 &= c \end{aligned}$$

Ergebnis: t: $y = 3x - 1$

b) $f(x) = 2\sqrt{x} + 1$; $P(4|f(4))$; $f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}$

$$P(4|5)$$

$$f'(4) = 0,5 = m$$

$$5 = 0,5 \cdot 4 + c \quad | -2$$

$$3 = c$$

Ergebnis: t: $y = 0,5x + 3$

HA: Nr 2

2 Die Tangente an die Parabel der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - x$ soll die Steigung m haben.

Es ist $f'(x) = 4x - 1$. Bestimmen Sie die Koordinaten des Berührungspunktes P .

a) $m = 3$

b) $m = -1$

c) $m = 5$

$$x_1 = 1 ; y_1 = 1$$

$$x_1 = 0 ; y_1 = 0$$

$$x_1 = 1,5 ; y_1 = 3$$

$$P(1 \mid 1)$$

$$P(0 \mid 0)$$

$$P(1,5 \mid 3)$$

$$4x - 1 = 3 \quad | +1$$

$$4x = 4 \quad | :4$$

$$x = 1$$

$$f(1) = 2 \cdot 1^2 - 1 = 1$$

$$4x - 1 = -1 \quad | +1$$

$$4x = 0$$

$$x = 0$$


$$4x - 1 = 5 \quad | +1$$

$$4x = 6 \quad | :4$$

$$x = 1,5$$

$$f(1,5) = 2 \cdot (1,5)^2 - (1,5)$$

Wiederholung: Winkelberechnungen



$\sin$	$\cos$	$\tan$	$\cot$
$\frac{G}{H}$	$\frac{A}{H}$	$\frac{G}{A}$	$\frac{A}{G}$

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{Satz des Pythagoras})$$

$$\sin(\alpha) = \frac{G}{H}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{A}{H}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{G}{A}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{0,5}{1} = \frac{m}{1} = m = 0,5$$

$$\alpha = \tan^{-1}(0,5) = 27^\circ$$

$\nearrow$
m

7.12.18

S59 A8

Bestimmen Sie den Steigungswinkel der Tangente an den Graphen von f im Punkt B .

a) $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 2$, $B(0,5 | f(0,5))$

b) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2$, $B(1,5 | f(1,5))$

c) $f(x) = -x^2 + x$, $B(1 | f(1))$

d) $f(x) = -x^4 - 2x^3$, $B(1 | f(1))$

$$\tan^{-1}(m) = \alpha$$

$$m = \tan(\alpha)$$

a) $m = 0,25$ $\alpha = 14^\circ$

b) $m = 1,5$ $\alpha = 56,3^\circ$

c) $m = -1$ $\alpha = -45^\circ$

d) $m = -10$ $\alpha = -84,3^\circ$

S.58 A9

9 In welchen Punkten des Graphen von f hat die Tangente den Steigungswinkel $21,8^\circ$?

a) $f(x) = 5x^2$ b) $f(x) = -\frac{40}{x} = -40x^{-1}$ c) $f(x) = \frac{5}{6}x^3$ d) $f(x) = 0,15x^2 - 0,2x$

$f'(x) = 10x = m$ $f'(x) = 40x^{-2} = \frac{40}{x^2}$

$m = \tan(\alpha) = \tan(21,8^\circ) = 0,4$

a)

$$10x = 0,4 \quad | :10$$

$$x = 0,04$$

$$y = 5 \cdot 0,04^2 = 0,008$$

$P(0,04 \mid 0,008)$

b)

$$\frac{40}{x^2} = 0,4 \quad | \cdot x^2$$

$$40 = 0,4x^2 \quad | :0,4$$

$$100 = x^2 \quad | \sqrt{}$$

$x_1 = 10$
 $x_2 = -10$

$P_1(10 \mid -4)$

$P_2(-10 \mid 4)$


c) $2,5x^2 = 0,4$
 $x^2 = 0,16$
 $x = \pm 0,4$

$P1(-0,4 \mid -0,053)$


$P2(0,4 \mid 0,053)$

d) $0,3x - 0,2 = 0,4$
 $0,3x = 0,6$
 $x = 2$

$P(2 \mid 0,2)$



III.1 Monotonie



Wir nennen eine Funktion in einem Intervall monoton fallend (bzw. steigend oder wachsend) wenn die Funktionswerte in diesem Intervall immer kleiner (bzw. größer) werden

Im monoton wachsenden Bereich gilt: $f'(x) \geq 0$

Im monoton fallenden Bereich gilt: $f'(x) \leq 0$

Ergänzung: streng monoton bedeutet, dass die Ableitung nicht $= 0$ sein darf.

S.101 A1




Welche Art von Monotonie gilt im gekennzeichneten Intervall I? Ordnen Sie zu.

*f ist in I streng
monoton wachsend.*

*f ist in I
monoton fallend.*




*f ist in I
monoton wachsend.*

*f ist in I streng
monoton fallend.*



S.101 A2

Der Graph von f ist für $-4 \leq x \leq 4$ skizziert. Entnehmen Sie dem Graphen im skizzierten Bereich möglichst große Intervalle, in denen die Funktion streng monoton wachsend bzw. fallend ist.



a)

Von -4 bis $-1 \rightarrow$ fallend

$$-4 \leq x \leq -1 \quad x \in [-4, -1]$$

Von -1 bis $4 \rightarrow$ steigend




$$-1 \leq x \leq 4 \quad x \in [-1, 4]$$

b) $[-4, -2] \rightarrow$ steigend

$[2, 4] \rightarrow$ steigend

$[-2, 2] \rightarrow$ fallend


Der Graph von f ist für $-4 \leq x \leq 4$ skizziert. Entnehmen Sie dem Graphen im skizzierten Bereich möglichst große Intervalle, in denen die Funktion streng monoton wachsend bzw. fallend ist.



c)


- $[-4, -2] \rightarrow$ steigend
- $[-2, 1] \rightarrow$ fallend
- $[-1, 1] \rightarrow$ steigend
- $[1, 4] \rightarrow$ fallend

$[-4, -2) \rightarrow$ streng




Achtung: Wollen wir ein streng monotonen Intervall haben, so dürfen wir Stellen mit $f'(x) = 0$ nicht mit dazu nehmen!




Z.B. können wir das Intervall dann an diesen Stellen mit einer runden Klammer schreiben.



III.2 Funktionen und deren Ableitungen



bis $\sim 0,2$ ist f' positiv
von $\sim 0,2$ bis $\sim 2,4$ ist f' negativ
von $\sim 2,4$ ab ist f' positiv









III.2 Funktionen und deren Ableitungen







Wollen wir zu einem Schaubild einer Funktion die zugehörige Ableitung finden, so betrachten wir die monotonen Bereiche der Funktion:

- im monoton wachsenden Bereich der Funktion ist die Ableitung positiv
- im monoton fallenden Bereich der Funktion ist die Ableitung negativ

Graphenpuzzle

Ordnen Sie den vorgegebenen Schaubildern der sechs Funktionen jeweils das passende Schaubild einer Ableitungsfunktion (auch: Änderungsfunktion oder Anstiegsfunktion) zu.

Funktionsgraphen	Ableitungsfunktionen
	
	
	










Funktionsgraphen	Ableitungsfunktionen
	
	
	

Arbeitsblatt zum „Graphenpuzzle“

Die folgenden Abbildungen zeigen mögliche Graphen von Ableitungsfunktionen. Schneiden Sie die Abbildungen aus und ordnen Sie diese den Schaubildern auf dem Arbeitsblatt „Graphenpuzzle“ richtig zu. Es ergibt sich ein weises Lösungswort.


*) Es bleiben drei Abbildungen übrig.

Jede zeigt die Ableitungsfunktion (Änderungsfunktion) einer unbekannten Funktion f . Kleben Sie die übriggebliebenen Abbildungen auf ein (leeres) kariertes Blatt. Skizzieren Sie zu jeder einen möglichen zugehörigen Funktionsgraphen f .

III.3. Extremstellen

Unter einer Extremstelle verstehen wir einen x -Wert, bei dem die Funktion ein Minimum (Tal) oder ein Maximum (Berg) annimmt



- lokale Extremstelle: jedes Tal & jeder Berg
- globale Extremstelle: die niedrigste bzw. höchste Stelle der betrachteten Funktion
- Hochpunkt $(1,75 | 4,3)$ $(-4,2 | 4,3)$ $(0 | 3,2)$
- Tiefpunkt $(-3 | -1)$ $(1 | 3)$ (s. 105)

S. 105 41


Welches Kärtchen passt zu welchem Graphen in Fig. 3?

Tiefpunkt $T(2|0)$


Hochpunkt $H(-1|4,5)$

Tiefpunkt $T(2|3)$

~~Lesen Sie am Graphen in Fig. 4 ab.~~



S. 105 A 2



- a) Extremstellen $-3.5, -2.5, -1.5, -0.5, 0.5, 2, 2.5, 3.5$
- b) Hoch-/Tiefpunkte
- c) globale Minimum + Maximum

Pizza:

Leni / Samira / Noemi / Vanessa

Tobi / Claudio / Emil / Nils

Naemi / Katja / Lena / Debora / Melanie

Aaron / Lisa / Kim / Chris

Maren / Antonia / Philip / Jasmin H / Vanessa

Rebecca / Ella / Jasmin / Johanna / Alexandra

Jede Gruppe bringt Teig + Belag selbst mit! 🍷

